

Vaccination contre l'*Haemophilus influenzae* type b

Repères

- Les pathologies à Hib touchent surtout les enfants de moins de deux ans dans les pays en développement.
- Les porteurs sains, comme les malades, peuvent propager Hib.
- Les pathologies à Hib peuvent affecter différentes parties du corps. Les pathologies graves les plus fréquentes sont la pneumonie et la méningite.
- Le vaccin conjugué Hib ne protège que contre la souche de type b. On trouve cette souche de type b dans 90% des cas graves d'*Haemophilus influenzae*.

Fig 1 : Evolution annuelle des cas confirmés de méningite à *Haemophilus* et à *S. pneumoniae*, Maroc, 1999–2014 :




Tableau I : Les vaccins contenant Hib : Hib, pentavalent (DTC+HepB+Hib) en bref

Type de vaccin	Conjugué (polyosidique capsulaire lié à une protéine porteuse)
Nombre de doses	3
Calendrier	<ul style="list-style-type: none"> - Administré en tant que pentavalent ou par injection séparée en même temps que DTC dès l'âge de 6 semaines - 3p+0 : 3 doses primaires administrées à des intervalles minimums de 4 semaines - 2p+1 : 2 doses primaires administrées à des intervalles minimums de 8 semaines et rappel au moins 6 mois après 2^{ème} dose primaire - 3p+1 : 3 doses primaires administrées à des intervalles minimums de 4 semaines et rappel au moins 6 mois après 3^{ème} dose primaire - Les enfants de plus de 12 mois qui n'ont pas reçu de série primaire peuvent recevoir une dose unique
Rappel	Comme ci-dessus
Contre-indications	Choc anaphylactique ou hypersensibilité (allergie) après une dose précédente
Manifestations indésirables	<ul style="list-style-type: none"> - Graves : aucune enregistrée à ce jour - Bénignes : réactions au point d'injection, fièvre
Précautions spéciales	Pour pentavalent : ne pas utiliser le vaccin pentavalent pour administrer la dose néonatale du vaccin contre l'hépatite B
Dosage	0,5 ml
Point d'injection	<ul style="list-style-type: none"> - Partie antéro-latérale (externe) de la cuisse chez les nourrissons - Muscle deltoïde du haut du bras chez les enfants moins jeunes et les adultes
Type d'injection	Intramusculaire
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> - Entre +2°C et +8°C - Ne pas congeler